



○ 医師が記入した意見書が望ましい感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹 (はしか)	発症 1 日前から発疹出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過してから
風疹	発疹出現の前 7 日から後 7 日 間くらい	発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発疹出現 1~2 日前から痂皮形 成してから	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺、顎下線、舌下線の腫脹が発 症してから 5 日を経過するまで、 かつ全身状態が良好になるまで消 失してから
結核		医師により感染の恐れがないと認 めるまで
咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数 日間	主な症状が消え 2 日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した 数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の 症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出 現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は 5 日 間の適正な抗菌性物質製剤による 治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌 感染症(O157,O26 O111 等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬によ る治療が終了し、48 時間をあけて 連続 2 回の検便によって、いずれ も菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から 1 ~ 2 週 間、便から数週間~数ヶ月排出 される	医師により感染の恐れがないと認 めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認 めるまで